



CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO  
**CLINICA SORRISO**  
 del bambino



## IL MORSO PROFONDO

Il morso profondo (o coperto o *deep bite*) è una malocclusione riscontrabile dal 15 al 20% della popolazione caratterizzata da incisivi superiori che sormontano eccessivamente gli inferiori per eccessiva eruzione o per rotazione mandibolare anteriore. Questa malocclusione determina soggettivamente problemi estetici ed oggettivamente problemi gengivali, articolari e usura dentale. Spesso presentano cefalea e problemi posturali di testa e collo. Frequentemente i soggetti con morso profondo presentano un angolo chiuso tra mascella e mandibola e masseteri ipertrofici per serramento e digrignamento.

### CLASSE II - DIVISIONE DUE -TIPO 1

In questo tipo di malocclusione tutto il gruppo incisivo superiore è retroclinato e sceso a coprire il gruppo incisivo antagonista. È la forma più frequente di morso profondo e anche la più complessa da correggere.



### CLASSE II - DIVISIONE DUE -TIPO 2

In questo tipo di malocclusione i due incisivi centrali superiori sono retroclinati ed estrusi mentre i due laterali sono inclinati verso l'esterno. È la forma esteticamente più vistosa di morso profondo ma di correzione meno complessa della precedente.



## CORREZIONE DEL MORSO PROFONDO

La correzione si può fare esclusivamente con apparecchiature fisse con l'ausilio di rialzi anteriori e posteriori. Talvolta per creare spazio è necessario anche fare delle estrazioni di premolari

